

คู่มือการให้บริการงานส่งเสริมสุขภาพ  
โรงพยาบาลแก่งกระเจาน  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล.....

เรื่อง : มาตรการให้บริการทางทันตกรรม

หน้า :


วันที่ : 17 พฤษภาคม 2562

แผนก : กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลแก่งกระเจาน

แผนกที่เกี่ยวข้อง : รพ.สต.ใน คปสอ.แก่งกระเจาน

คณะผู้จัดทำ : คณะกรรมการจัดทำคู่มือการให้บริการงาน  
ส่งเสริมสุขภาพ

ผู้ควบคุมกำกับ



(นายสุขประเสริฐ ทับสี)  
สาธารณสุขอำเภอแก่งกระเจาน


ผู้ทบทวน :



(นายชิต เตริยมศิริวรกุล)

ทันตแพทย์ชำนาญการ

ผู้อนุมัติ



(นายจตุภูมิ นิละศรี)  
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งกระเจาน

แนวทางแก้ไขปัญหาทันตกรรม

ตรวจ ชักประวัติ ถามอาการ



จ่ายยาตามอาการของคนไข้



ส่งต่อ หรือแนะนำคนไข้ ให้เข้ารับบริการทางทันตกรรม ในวันเวลาราชการ

## ยาปฏิชีวนะ

ชื่อยา	Amoxicillin
ขนาดยา	Capsule 500 mg
วิธีการใช้	กินยา 500 mg วันละ 3 ครั้งก่อนหรือหลังอาหาร หรือ ทุก 8 ชั่วโมง (ขนาดและวิธีใช้ยาปรับเปลี่ยนได้ตามอายุและน้ำหนักของผู้ป่วย)
ระยะเวลาในการใช้ยา	5-7 วัน
ข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญ	อาจพบปฏิกิริยาภูมิแพ้แบบเฉียบพลัน ผื่น คลื่นไส้อาเจียนได้โดยปฏิกิริยาภูมิแพ้เฉียบพลันถือเป็นผลข้างเคียงที่สำคัญ แต่พบได้น้อยมากและควรได้รับการรักษาโดยทันทีและการแพ้ยาในกลุ่ม penicillins ชนิดใดชนิดหนึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการแพ้ยาชนิดอื่นในกลุ่ม(crosssensitivity) ได้ด้วย

## ยาปฏิชีวนะที่ควรเลือกใช้เป็นอันดับรอง

ชื่อยา	Clindamycin
ขนาดยา	Capsule 150 mg, 300 mg
วิธีการใช้	ผู้ใหญ่: กินยา 600 mg วันละ 3 ครั้งหลังอาหาร (ไม่เกิน 45 mg/น้ำหนักตัว 1 kg/วัน) เด็ก: กินยา 10-20 mg /น้ำหนักตัว 1 kg/วัน (แบ่งให้ทุก 8 ชั่วโมง)
ระยะเวลาในการใช้ยา	7-10 วัน
ข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญ	Pregnancy category B Adverse effect: 1. Diarrhea 2. Abdominal pain

### ยาต้านการอักเสบและระงับปวด

ชื่อยา	Ibuprofen
ขนาดยา	Tablet 200 mg, 400 mg
วิธีการใช้	กินยา 400 mg วันละ 3 ครั้งหลังอาหารทันที
ระยะเวลาในการใช้ยา	3-5 วัน (ขึ้นกับอาการปวด)
ข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญ	- ใช้ในเด็กที่มีอายุ 3 เดือนขึ้นไปเท่านั้น - ระมัดระวังการใช้ในผู้ป่วยที่มีเกล็ดเลือดต่ำ เช่น ไข้เลือดออก - ระคายเคืองกระเพาะอาหาร ควรหลีกเลี่ยงในผู้ป่วยที่เป็นโรคกระเพาะ

### ยาต้านการอักเสบและระงับปวดที่ควรเลือกใช้เป็นอันดับรอง

ชื่อยา	Paracetamol (Acetaminophen)
ขนาดยา	Tablet 325, 500 mg; Sterile syrup 120 mg/5 ml
วิธีการใช้	กินยา 325 mg หรือ 500 mg ทุก 4 ชั่วโมง เฉพาะเมื่อมีอาการปวด. เด็ก 12.5-15 mg/น้ำหนักตัว 1 kg (ขนาดและวิธีใช้ยาปรับเปลี่ยนได้ตามอายุและน้ำหนักของผู้ป่วย)
ระยะเวลาในการใช้ยา	เมื่อมีอาการปวด
ข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญ	- ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคตับ - สำหรับผู้ใหญ่ ไม่ควรกินยานี้ในขนาดสูงมากกว่าครั้งละ 1,000 mg (2 tab.) ทุก 4-6 ชั่วโมง หรือ เกินวันละ 4,000 mg (8 tab.) และไม่ควรรักษาติดต่อกัน มากกว่า 5-10 วัน - สำหรับเด็ก ไม่ควรกินยาติดต่อกันมากกว่า 3-5 วัน